

Varietäten-Buch.

Anatomische Anstalt
Jena.

1875.

Selectat varietas.

Auglekt 1875. Was da bis 1881 gesepft von K. Bardsleben, auf Sachbesitzern von
Prof. J. Sömalke, Bardsleben u. d.
Bydena für die Jahre von 1873, Lomon

Miomboidei

2/11 Beiderseitig entspringt ein Muskel, der nach Lage und Verlauf zum Miomboideum gehört, von demselben aber durch eine breite Lücke getrennt ist, mit breiter, platter Ursprungssehne von den Fortsätzen der IV-VI Brustwirbel. Der Muskel verbreitert in seinem ~~unteren~~ ^{distalwärts} Ende bald fleischig und ist hier weniger platt. Insertion am unteren Winkel der Basis Scapulae.

Sylenii.

Sacrospinalis.

Spinales

Inversio - spiralis.

(Semi-spirales, multiformes, rotatores longi etc)

Insuperioribus, intertransversarii parte, levator. cost.

Recti cap. post. v. lat. Obliqui cap. 592. v. lat.

2.

Laut M.

Rectus abdom

Zust. etc. d. Zerst. etc.

74. bei besond. Zustand an 5. Ri, lat. u. quädelis. r. 2. 18. Papir hat 3. 4. Ri. 1800 u. 1801
 00. 2. 7. mündl. Rectus abdomin. bricht, nicht mehr bei grossen Mannern
 in lateral. Zippel gest. 5. Ri. 1800 u. 1801
 Obliqui. holoffel bricht, bräunlich. fast fehlend

Obliquus int.

Transversus abd.

Diaphragma

Gubelarius.

W/om (K. 12. r. ganz Infing. pathol. d. Genes. 174)

Leise 2. 1828/29 portio claviculæ pect. min.

Wom oben untern Rande löst sich ein von 1/2 cm
breites Bündel ab und verläuft ungefürt mittel auf oben
über fascia coraco-pectoralis zum unteren Rande der
Clavicula, wo es zum N. Lignum et Deltoidei.

Verläuft, 7. Th. auf beiden von diesem inserirt. 11. Th.
f. fascia coraco-pect. fast ab. keinen Zusammenhang. *Verwahrh.*


Le 5. Lat. Rand H. M. in P. fast mit Fascie ^{antr.} zusammen; letzter fast. D. d. h. in d. P. ist. -
Leise 2. 6. etc. alle, was 2. verflochten (also Norm.)

Serrat. ant. mj.

Herbario de la Colección de la Real Academia de Ciencias, que se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid.
a. p. m. en fabrica de papel.

Infractavicularis, Bardsley *Supractavicularis, Zussk. Kar.*
 M.L. 18. Mit l. Infract. & supractav. Bardsley prop. p. Bardsley 11/77.

16/89:
 M.L. 20. M. r.



W. S. 91/92. Bei einem Gefäßpräparat ein M. supractavicularis beobachtet Vogt.
 Ferner bei einer weiblichen Leiche bei Douville.

Intercostales. Transversi Thoracis.

78
 Trianguli sterni sit in I. Rippe, pectus inlaufend (erst auf, dann im Innern
 Sternalis u. Stern-) Coll. mit 2 -
 von 80. d. L. 5. W. links, Intercost. ganz frei von in 3. Rippe verläuft, alle 2 Intercostales tiefgehend
 von 2. - 4. Rippe

Supracostalis.

Galb. M.

Platysma.

7/77. W. 18. N. stark, Amoyz der Mittelmeer. Bei

Herpocleiodonastri or *transv. nuchae*.



Biventer mandib. s. Ligastr. max. inf.

75. ^{76.} Nou. lev. geht 1 ell ein z Metallin, non va, anlyrupud d' Anlauf ad genio.
Knochen, 3 Kiefer. beid.

Doppelte 1879. Lithoed. den od Grah
— — — — — L. 18. beid. —



Patr. doppelt Biventer. nach Grah.
L. 24.

1880. dopp. L. 5. neu. ^{Paup!} Ist normal!

Patra = dopp. Biventer

gl. auch! 2 oder im Geniohyoid superficialis.
Pyram. d. Rectus, Fohp. d. Hyoid

1881. L. 6. beid. Biv.
dopp. nach Grah d. Biv. ist od fop. neu. du!

(1. Macalister, descriph. catel. of muscu. anatom. in hum. anat. Tabl. 1879. 40.)

Hyloxyoides

75/76. M. Thy. a. - Thy. gummiplastisch - Lunde z. clavicula.

86/87 M. L. 20. Beiderseits im Stenohyoides 4 cm. über Schlüsselbein eine Inscriptio tendinea.
Linke Höhe oben zwischen 1. - 2. Drittel des Muskels eine zweite, war davon
angedeutet.

Sterna thyroidea Thyrocygna Trass. colli

76/77: M.L.13. England. Thy. Br. - 77/78. England. Thy. M.L.10. - 78/79. Eng. gl. L.20 (w. w.) -

99/100 M.L.10. England. Thy. ^{land} sent with light photo.

20/1/100

20/1/100

20/1/100

76/79 Gen. vryl t. bud. 2. 10. 10.

Mylotygoid. Geniotygoid.

Scaleni

78/ ca. 13. beord
 fm aut med., pater N., utriusque Scali boni, pater 3 I Ri, Marini fm ante, & med. dnd.
 fm utriusque Scali boni.

Levator scap.

78. 15/2 - Jap. Papo. r. 1. Kypfel z. 1. Rizza - 78. 11/2 La 5. (Koll.) daffaltz r. Mani bogru; F. haan.
78. 11/2 Kypfel an La. Koll. L. 2. (Koll.) r. - Kypfel z. 2. Ri. L. 13. r.
87. 1/2 z. 2. Ri. 2 mal. Nay öfter brach. Hant fup fünfzig

Longus colli, long. atl., long. cap. (r. cap. ant. nij.)

Intertransvers. ant. Rect. cap. ant. (mix).

Zucht

am Markt n. 23 in Straß, 9^{te} Lagen auf Gafelbühnen, von dort abgeh. in F. andrad

L. 20. weith (2 Lev. gl. - thy. clon)

Kopf M.

Episcranius. (Front. occipit. proc., ~~Opisthion.~~)

20/1076. Vollständige Kräfte 1. 2. br. M. u. 3. fusi-tempor. 3. nach Zeit der Opf. : attrahens. Auf dem Taf. n. episcra
M. 2. 1. Br.

Gipsy Hill. I. 17. 18. Zygomaticus, osseus, triang. nati.

II. *Ulyss.*

Quadr. tab. sup., caninus, quadr. meati.

III. April:

Buccinator, spheruliferus, raris, nasalis, mentalis.

Massester in Temporalis.

Pterygoidei.

Supra - macropis. , teres minor -

1796 - Teres minor füllt Gallylapp, barts - Kopf 2 Mal hoch -

1796 C. 16. r. T. m. rudimentär, ratzen an einem Vespauglath, wie fl. 1793, Kopf klein, blasse Fapp

