



Anlage 2.1 WHO Klassifikation der AML nach Harris et al. 2000

| WHO Klassen | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AML mit typischen zytogenetischen Veränderungen | <ul style="list-style-type: none"> - AML mit t(8;21)(q22;q22); AML1/ETO - AML mit abnormen Knochenmarkeosinophilen und inv(16)(p13q22) oder t(16;16)(p13;q22); CBFβ/MYH11 - Akute Promyelozytenleukämie - AML M3 mit t(15;17)(q22;q11-12) (PML/RARα) - und Varianten - AML mit 11q23-(MLL-)Anomalien |
| AML mit multilineärer Dysplasie (mindestens 2 Linien betroffen) | <ul style="list-style-type: none"> - AML mit vorausgegangener Myelodysplasie/myeloproliferativem Syndrom - De-novo-AML ohne vorausgegangenes Syndrom |
| Therapieinduzierte AML und therapieinduziertes myelodysplastisches Syndrom (MDS) | <ul style="list-style-type: none"> - AML/MDS nach Gabe von Alkylanzien - AML/MDS nach Therapie mit Topoisomerase-II-Inhibitoren - AML/MDS nach sonstiger Chemo-/Strahlentherapie |
| AML ohne andere Einordnungsmöglichkeit | <ul style="list-style-type: none"> - AML, minimal differenziert (FAB M0) - AML ohne Ausreifung (FAB M1) - AML mit Ausreifung (FAB M2) - Akute myelomonozytäre Leukämie (FAB M4) - Akute monozytäre Leukämie (FAB M5a, b) - Akute Erythroleukämie (FAB M6) - Akute Megakaryoblastenleukämie (FAB M7) - Akute Basophilenleukämie - Akute Panmyelose mit Myelofibrose - Myelosarkom/Chlorom |


Anlage 2.2 Therapiekonzept gemäß OSO # 33 (AML '96)



Anlage 2.3 Therapiekonzept gemäß OSO # 33 (AML '96) (Therapie Arm A)



Anlage 2.4 Therapiekonzept gemäß OSO # 33 (AML '96) (Therapie Arm B)



Anlage 2.5 Therapiekonzept gemäß OSHO # 61 (AML 2002)

*zytogenetische Hochrisiko-Pat.:
(-5/5q-, -7/7q-, abn(11q23),
komplex aberrant.

Induktion 1:


- Ara C (2x1g/m² d1,3,5,7) und Idarubicin (12mg/m², d1-3)

Randomisierte Induktion 2:


- Ara C (2x1g/m² d1-5), Mitoxantron (7mg/m² d1,3,5), Fludarabin (2x15mg/m² d1-5), G-CSF vs. AraC (2x1g/m² d1,3,5,7), Mitoxantron (10mg/m² d1-3)

Randomisiert 1 oder 2 Konsolidierungen:

- 1. Konsolidierung: Wie Zyklus zur CR + evt. G-CSF
- 2. Konsolidierung: AraC (2x1g/m² d1+2), Mitoxantron (10mg/m² d1+2), evt. G-CSF
- 3. Konsolidierung: Ara C (2x1g/m² d1,3,5), Idarubicin (12mg/m² d1+2)



Anlage 2.6 Therapiekonzept gemäß OSO # 38 (AML '97) (Patienten > 60Jahre)



Therapiekonzept gemäß OSO # 45 (Patienten >60 Jahre)

Das Protokoll OSO # 45 ist analog zum Behandlungsprotokoll OSO # 38 (AML '97) zu sehen, wobei die Rolle der allogenen Stammzelltransplantation (SCT) im Vergleich zu einer zweiten Konsolidierung auf das leukämiefreie Überleben (LFS) von Patienten über 60 Jahre in kompletter Remission einer AML in einer Phase III Studie untersucht wird.

Anlage 4.2

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Patientenr. | | | | | | | | |
| Name | | | | | | | | |
| Alter | | | | | | | | |
| Geschlecht | | | | | | | | |
| Anamnese | | | | | | | | |
| Diagnose/FAB | | | | | | | | |
| Cytogenetik | | | | | | | | |
| Fieber v. Therapie | | | | | | | | |
| LP (t) | I1 | | I2 | | K1 | | K2 | |
| Outcome | I1 | CR PR NR/R Ø p. Reg. | I2 | CR PR NR/R Ø p. Reg. | K1 | CR PR NR/R Ø p. Reg. | K2 | CR PR NR/R Ø p. Reg. |

**Anlage 4.3 Beziehung zwischen dem Therapieergebnis der einzelnen
Behandlungsabschnitte (I1, I2, K1, K2) und den Altersklassen
≤ 60 Jahre und > 60 Jahre**

1= OSHO ≤ 60 Jahre

2= OSHO > 60 Jahre

| | | Therapieergebnis_I1 | | | Gesamt | |
|--------------------|---|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | CR | PR | Rez | | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 19 | 12 | 4 | 35 |
| | | % von Altersklassen | 54,3% | 34,3% | 11,4% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | 1,0 | ,2 | -1,4 | |
| | 2 | Anzahl | 13 | 11 | 12 | 36 |
| | | % von Altersklassen | 36,1% | 30,6% | 33,3% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | -1,0 | -,2 | 1,4 | |
| Signifikanz | | Anzahl | 32 | 23 | 16 | 71 |
| p=0,09 | | % von Altersklassen | 45,1% | 32,4% | 22,5% | 100,0% |

| | | Therapieergebnis_I2 | | | Gesamt | |
|-------------------|---|---------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | CR | PR | Rez | | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 6 | 6 | 1 | 13 |
| | | % von Altersklassen | 46,2% | 46,2% | 7,6% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 6 | 6 | 3 | 15 |
| | | % von Altersklassen | 40,0% | 40,0% | 20,0% | 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtanzahl | 12 | 12 | 4 | 28 |
| | | % von Altersklassen | 42,9% | 42,9% | 14,2% | 100,0% |

| | | Therapieergebnis_K1 | | | Gesamt | |
|--------------------|---|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | CR | PR | Rez | | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 19 | 6 | 0 | 25 |
| | | % von Altersklassen | 76,0% | 24,0% | ,0% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | ,9 | -,3 | -1,7 | |
| | 2 | Anzahl | 8 | 6 | 5 | 19 |
| | | % von Altersklassen | 42,1% | 31,6% | 26,3% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | -1,1 | ,4 | 1,9 | |
| Signifikanz | | Anzahl | 27 | 12 | 5 | 44 |
| p=0,01 | | % von Altersklassen | 61,3% | 27,3% | 11,4% | 100,0% |

| | | Therapieergebnis_K2 | | | Gesamt | |
|--------------------|---|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| | | CR | PR | Rez | | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 12 | 2 | 1 | 15 |
| | | % von Altersklassen | 80,0% | 13,3% | 6,7% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | 1,1 | -,6 | -1,2 | |
| | 2 | Anzahl | 5 | 4 | 5 | 14 |
| | | % von Altersklassen | 35,7% | 28,6% | 35,7% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | -1,1 | ,6 | 1,2 | |
| Signifikanz | | Anzahl | 17 | 6 | 6 | 29 |
| p=0,05 | | % von Altersklassen | 58,6% | 20,7% | 20,7% | 100,0% |

Anlage 5.1 Anzahl (absolut) der durchgeführten apparativen Untersuchungen in den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik | Untersuchungen OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | Untersuchungen OSHO >60J. (Pat. n=54) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 514 | 517 |
| Röntgen NNH | 104 | 86 |
| Sono Abdomen | 71 | 60 |
| Echokardiographie | 62 | 53 |
| Lungenfunktion | 29 | 32 |
| Skelett Röntgen | 10 | 22 |
| Röntgen Abdomen | 9 | 5 |
| CT Thorax | 22 | 16 |
| CT Abdomen | 6 | 5 |
| CT Schädel | 12 | 26 |
| MRT Schädel | 1 | 4 |
| MRT „divers“ | 2 | 8 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 3 |
| Duplexsonographie | 19 | 17 |
| Bronchoskopie | 6 | 5 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>868</i> | <i>860</i> |

Anlage 5.2 Anzahl (absolut und %) der abw./path. Befunde in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen gesamt

| Diagnostik | Untersuchungen Gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen mit abw./path. Befunde | % Anteil der abw./path. Befunde |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Röntgen Thorax | 1031 | 725 | 70,3 |
| Röntgen NNH | 190 | 95 | 50,0 |
| Sono Abdomen | 131 | 91 | 69,5 |
| Echokardiographie | 115 | 74 | 64,5 |
| Lungenfunktion | 61 | 25 | 45,9 |
| Skelett Röntgen | 32 | 24 | 75,0 |
| Röntgen Abdomen | 14 | 10 | 71,4 |
| CT Thorax | 38 | 35 | 92,1 |
| CT Abdomen | 11 | 9 | 81,8 |
| CT Schädel | 38 | 27 | 71,1 |
| MRT Schädel | 5 | 5 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 10 | 10 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 2 | 50,0 |
| Duplexsonographie | 36 | 17 | 47,2 |
| Bronchoskopie | 11 | 10 | 90,9 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1728</i> | <i>1160</i> | <i>67,1</i> |

Anlage 5.3 Anzahl (absolut) abw./path. Befunde in den einzelnen Untersuchungen der Altersgruppen ≤60J. und >60J in Beziehung zu der Anzahl der insgesamt durchgeführten Untersuchungen

| Diagnostik | Untersuchungen OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | Untersuchungen OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| | Untersuchungen gesamt | Untersuchungen mit abw./path. Befunden | Untersuchungen gesamt | Untersuchungen mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 514 | 330 | 517 | 395 |
| Röntgen NNH | 104 | 52 | 86 | 43 |
| Sono Abdomen | 71 | 45 | 60 | 46 |
| Echokardiographie | 62 | 32 | 53 | 42 |
| Lungenfunktion | 29 | 15 | 32 | 10 |
| Skelett Röntgen | 10 | 5 | 22 | 19 |
| Röntgen Abdomen | 9 | 7 | 5 | 3 |
| CT Thorax | 22 | 20 | 16 | 15 |
| CT Abdomen | 6 | 5 | 5 | 4 |
| CT Schädel | 12 | 5 | 26 | 22 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 4 | 4 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 8 | 8 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Duplexsonographie | 19 | 12 | 17 | 5 |
| Bronchoskopie | 6 | 6 | 5 | 4 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>868</i> | <i>538 (62,0%)</i> | <i>860</i> | <i>622 (72,3%)</i> |

Anlage 5.4 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen gesamt

| Diagnostik | Untersuchungen gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen als Screening | % Anteil der Screeninguntersuchungen |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 1031 | 144 | 14,0 |
| Röntgen NNH | 190 | 92 | 48,4 |
| Sono Abdomen | 131 | 72 | 55,0 |
| Echokardiographie | 115 | 63 | 54,8 |
| Lungenfunktion | 61 | 54 | 88,5 |
| Skelett Röntgen | 32 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 14 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 38 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 11 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 38 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 5 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 10 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 36 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 11 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1728</i> | <i>425</i> | <i>24,6</i> |

**Anlage 5.5 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen der Altersgruppen
≤60J. und >60J.**

| Diagnostik | Screening OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | Screening OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 69 | 75 |
| Röntgen NNH | 47 | 45 |
| Sono Abdomen | 35 | 37 |
| Echokardiographie | 28 | 35 |
| Lungenfunktion | 26 | 28 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>205</i> | <i>220</i> |

**Anlage 5.6 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen in
Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen gesamt.**

| Diagnostik | Untersuchungen gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen ereignisbez. | % Anteil der ereignisbez. Untersuchungen |
|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 1031 | 553 | 53,6 |
| Röntgen NNH | 190 | 68 | 35,8 |
| Sono Abdomen | 131 | 44 | 33,6 |
| Echokardiographie | 115 | 38 | 33,0 |
| Lungenfunktion | 61 | 6 | 9,8 |
| Skelett Röntgen | 32 | 31 | 96,9 |
| Röntgen Abdomen | 14 | 14 | 100,0 |
| CT Thorax | 38 | 35 | 92,1 |
| CT Abdomen | 11 | 9 | 81,8 |
| CT Schädel | 38 | 33 | 86,8 |
| MRT Schädel | 5 | 5 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 10 | 9 | 90,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 4 | 100,0 |
| Duplexsonographie | 36 | 32 | 88,9 |
| Bronchoskopie | 11 | 11 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1728</i> | <i>893</i> | <i>51,7</i> |

Anlage 5.7 Anzahl (absolut) ereignisbezogener Untersuchungen der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik | Ereignisbez. Untersuchung OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | Ereignisbez. Untersuchung OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 294 | 259 |
| Röntgen NNH | 41 | 27 |
| Sono Abdomen | 27 | 17 |
| Echokardiographie | 19 | 19 |
| Lungenfunktion | 2 | 4 |
| Skelett Röntgen | 6 | 25 |
| Röntgen Abdomen | 9 | 5 |
| CT Thorax | 20 | 15 |
| CT Abdomen | 4 | 5 |
| CT Schädel | 10 | 23 |
| MRT Schädel | 1 | 4 |
| MRT „divers“ | 2 | 7 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 3 |
| Duplexsonographie | 15 | 17 |
| Bronchoskopie | 6 | 5 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>457</i> | <i>436</i> |

Anlage 5.8 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen in Beziehung zu den Untersuchungen gesamt

| Diagnostik | Untersuchungen gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen als VK | % Anteil der VK |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Röntgen Thorax | 1031 | 336 | 32,6 |
| Röntgen NNH | 190 | 31 | 16,3 |
| Sono Abdomen | 131 | 12 | 9,2 |
| Echokardiographie | 115 | 14 | 12,2 |
| Lungenfunktion | 61 | 1 | 1,6 |
| Skelett Röntgen | 32 | 1 | 3,1 |
| Röntgen Abdomen | 14 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 38 | 3 | 7,9 |
| CT Abdomen | 11 | 2 | 18,2 |
| CT Schädel | 38 | 5 | 13,2 |
| MRT Schädel | 5 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 10 | 1 | 10,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 36 | 4 | 11,1 |
| Bronchoskopie | 11 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1728</i> | <i>410</i> | <i>23,7</i> |

Anlage 5.9 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik | VK OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | VK OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Röntgen Thorax | 165 | 171 |
| Röntgen NNH | 17 | 14 |
| Sono Abdomen | 6 | 6 |
| Echokardiographie | 9 | 5 |
| Lungenfunktion | 1 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 2 | 1 |
| CT Abdomen | 2 | 0 |
| CT Schädel | 2 | 3 |
| MRT Schädel | 1 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>208</i> | <i>202</i> |

Anlage 5.10 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen gesamt

| Diagnostik | Screening gesamt (Pat. n=97) | Screening mit abw./path. Befunden | % Anteil der Screening- untersuchungen mit abw./path. Befunden |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 144 | 80 | 55,6 |
| Röntgen NNH | 92 | 29 | 31,5 |
| Sono Abdomen | 72 | 47 | 65,3 |
| Echokardiographie | 63 | 37 | 58,7 |
| Lungenfunktion | 54 | 22 | 40,7 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>425</i> | <i>215</i> | <i>50,6</i> |

Anlage 5.11 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Screening gesamt | Screening mit abw./path. Befunden | Screening gesamt | Screening mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 69 | 32 | 75 | 48 |
| Röntgen NNH | 47 | 15 | 45 | 14 |
| Sono Abdomen | 35 | 21 | 37 | 26 |
| Echokardiographie | 28 | 11 | 35 | 26 |
| Lungenfunktion | 26 | 13 | 28 | 9 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>205</i> | <i>92 (44,9%)</i> | <i>220</i> | <i>123 (55,9%)</i> |

Anlage 5.12 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen gesamt

| Diagnostik | Ereignisbez. Untersuchungen gesamt (Pat.n=97) | Ereignisbez. Untersuchungen mit abw./path. Befunden | % Anteil der ereignisbez. Untersuchungen mit abw./path. Befunden |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 553 | 340 | 61,5 |
| Röntgen NNH | 68 | 41 | 60,3 |
| Sono Abdomen | 44 | 32 | 72,7 |
| Echokardiographie | 38 | 25 | 65,8 |
| Lungenfunktion | 6 | 2 | 33,3 |
| Skelett Röntgen | 31 | 24 | 77,4 |
| Röntgen Abdomen | 14 | 10 | 71,4 |
| CT Thorax | 35 | 32 | 91,4 |
| CT Abdomen | 9 | 7 | 77,8 |
| CT Schädel | 33 | 22 | 66,7 |
| MRT Schädel | 5 | 5 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 9 | 9 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 2 | 50,0 |
| Duplexsonographie | 32 | 13 | 40,6 |
| Bronchoskopie | 11 | 10 | 90,9 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>893</i> | <i>575</i> | <i>64,4</i> |

Anlage 5.13 Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| | Ereignisbez. Untersuchungen gesamt | Ereignisbez. Untersuchung mit abw./path. Befunden | Ereignisbez. Untersuchungen gesamt | Ereignisbez. Untersuchung mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 294 | 184 | 259 | 156 |
| Röntgen NNH | 41 | 21 | 27 | 20 |
| Sono Abdomen | 27 | 18 | 17 | 14 |
| Echokardiographie | 19 | 12 | 19 | 13 |
| Lungenfunktion | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Skelett Röntgen | 6 | 4 | 25 | 20 |
| Röntgen Abdomen | 9 | 7 | 5 | 3 |
| CT Thorax | 20 | 18 | 15 | 14 |
| CT Abdomen | 4 | 3 | 5 | 4 |
| CT Schädel | 10 | 4 | 23 | 18 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 4 | 4 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 7 | 7 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Duplexsonographie | 15 | 7 | 17 | 6 |
| Bronchoskopie | 6 | 6 | 5 | 4 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>457</i> | <i>290 (63,5%)</i> | <i>436</i> | <i>285 (65,4%)</i> |

Anlage 5.14 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen gesamt

| Diagnostik | VK gesamt (Pat.n=97) | VK mit abw./path. Befunden | % Anteil der VK mit abw./path. Befunden |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 336 | 307 | 91,4 |
| Röntgen NNH | 31 | 25 | 80,6 |
| Sono Abdomen | 12 | 11 | 91,7 |
| Echokardiographie | 14 | 12 | 85,7 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelett Röntgen | 1 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 3 | 3 | 100,0 |
| CT Abdomen | 2 | 1 | 50,0 |
| CT Schädel | 5 | 5 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 4 | 4 | 100,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>410</i> | <i>370</i> | <i>90,0</i> |

**Anlage 5.15 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen mit
abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der
Verlaufskontrollen gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.**

| Diagnostik | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | VK gesamt | VK mit abw./path. Befunden | VK gesamt | VK mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 165 | 144 | 171 | 163 |
| Röntgen NNH | 17 | 17 | 14 | 8 |
| Sono Abdomen | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Echokardiographie | 9 | 10 | 5 | 2 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CT Abdomen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtanzahl | 208 | 187 (89,9%) | 202 | 183 (90,6%) |

**Anlage 5.16 Anzahl (absolut) der durchgeführten apparativen Untersuchungen der 1.
Induktion (I1) in den Altersgruppen ≤60J. und >60J.**

| Diagnostik (I1) | Untersuchungen I1 OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | Untersuchungen I1 OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 293 | 311 |
| Röntgen NNH | 78 | 60 |
| Sono Abdomen | 44 | 49 |
| Echokardiographie | 52 | 45 |
| Lungenfunktion | 29 | 31 |
| Skelett Röntgen | 5 | 9 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 4 |
| CT Thorax | 12 | 15 |
| CT Abdomen | 5 | 3 |
| CT Schädel | 9 | 17 |
| MRT Schädel | 1 | 3 |
| MRT „divers“ | 1 | 3 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 3 |
| Duplexsonographie | 6 | 8 |
| Bronchoskopie | 3 | 4 |
| Gesamtanzahl | 549 (12,8U/P) | 566 (10,5U/P) |

**Anlage 5.17 Anzahl (absolut und %) der abw./path. Befunde in I1 in
Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen I1 gesamt.**

| Diagnostik | Untersuchungen I1 gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der abw./path. Befunde I1 |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 606 | 471 | 77,7 |
| Röntgen NNH | 134 | 63 | 47,0 |
| Sono Abdomen | 102 | 69 | 67,6 |
| Echokardiographie | 97 | 59 | 60,8 |
| Lungenfunktion | 60 | 24 | 40,0 |
| Skelett Röntgen | 14 | 11 | 78,6 |
| Röntgen Abdomen | 7 | 5 | 71,4 |
| CT Thorax | 27 | 25 | 92,6 |
| CT Abdomen | 8 | 7 | 87,5 |
| CT Schädel | 26 | 19 | 73,1 |
| MRT Schädel | 4 | 4 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 4 | 4 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 2 | 50,0 |
| Duplexsonographie | 14 | 3 | 21,4 |
| Bronchoskopie | 7 | 6 | 85,7 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1115 (11,5U/P)</i> | <i>773</i> | <i>69,3</i> |

**Anlage 5.18 Anzahl (absolut) abweichender/path. Befunde I1 in den einzelnen
Untersuchungen der Altersgruppen ≤60J. und >60J in Beziehung zu der
Anzahl der insgesamt durchgeführten Untersuchungen I1**

| Diagnostik (I1) | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| | Untersuchungen I1 gesamt | Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden | Untersuchungen I1 gesamt | Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 293 | 216 | 311 | 255 |
| Röntgen NNH | 78 | 35 | 60 | 28 |
| Sono Abdomen | 44 | 31 | 49 | 38 |
| Echokardiographie | 52 | 23 | 45 | 36 |
| Lungenfunktion | 29 | 15 | 31 | 9 |
| Skelett Röntgen | 5 | 1 | 9 | 10 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 3 | 4 | 2 |
| CT Thorax | 12 | 11 | 15 | 14 |
| CT Abdomen | 5 | 4 | 3 | 3 |
| CT Schädel | 9 | 5 | 17 | 14 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 3 | 3 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Duplexsonographie | 6 | 2 | 8 | 1 |
| Bronchoskopie | 3 | 3 | 4 | 3 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>549 (12,8U/P)</i> | <i>352 (64,1%)</i> | <i>566 (10,5U/P)</i> | <i>421 (74,4%)</i> |

Anlage 5.19 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen I1 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen I1 gesamt

| Diagnostik I1 | Untersuchungen I1 gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen I1 als Screening | % Anteil der Screeninguntersuchungen I1 |
|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 606 | 100 | 16,5 |
| Röntgen NNH | 134 | 76 | 56,7 |
| Sono Abdomen | 102 | 67 | 56,7 |
| Echokardiographie | 97 | 58 | 59,8 |
| Lungenfunktion | 60 | 53 | 88,3 |
| Skelett Röntgen | 14 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 7 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 27 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 8 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 26 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 4 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 4 | 0 | 0,0 |
| Lungenzintigraphie | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 14 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 7 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1115 (11,5U/P)</i> | <i>354 (3,7U/P)</i> | <i>31,7</i> |

Anlage 5.20 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I1) | Screening I1 OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | Screening I1 OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 47 | 53 |
| Röntgen NNH | 39 | 37 |
| Sono Abdomen | 33 | 34 |
| Echokardiographie | 27 | 31 |
| Lungenfunktion | 26 | 27 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>172 (4,0 U/P)</i> | <i>182 (3,4 U/P)</i> |

Anlage 5.21 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 gesamt

| Diagnostik I1 | Untersuchungen I1 gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen I1 ereignisbez. | % Anteil der ereignisbez. Untersuchung I1 |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 606 | 297 | 49,0 |
| Röntgen NNH | 134 | 43 | 32,1 |
| Sono Abdomen | 102 | 25 | 24,5 |
| Echokardiographie | 97 | 29 | 29,9 |
| Lungenfunktion | 60 | 6 | 10,0 |
| Skelett Röntgen | 14 | 14 | 100,0 |
| Röntgen Abdomen | 7 | 7 | 100,0 |
| CT Thorax | 27 | 25 | 92,6 |
| CT Abdomen | 8 | 7 | 87,5 |
| CT Schädel | 26 | 21 | 80,8 |
| MRT Schädel | 4 | 4 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 4 | 4 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 4 | 100,0 |
| Duplexsonographie | 14 | 14 | 100,0 |
| Bronchoskopie | 7 | 7 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1115 (11,5U/P)</i> | <i>508 (5,2U/P)</i> | <i>45,6</i> |

Anlage 5.22 Anzahl (absolut) ereignisbezogener Untersuchungen I1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I1) | Ereignisbez. Untersuchung I1 OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | Ereignisbez. Untersuchung I1 OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 160 | 137 |
| Röntgen NNH | 29 | 14 |
| Sono Abdomen | 15 | 10 |
| Echokardiographie | 13 | 16 |
| Lungenfunktion | 2 | 4 |
| Skelett Röntgen | 1 | 13 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 4 |
| CT Thorax | 11 | 14 |
| CT Abdomen | 4 | 3 |
| CT Schädel | 7 | 14 |
| MRT Schädel | 1 | 3 |
| MRT „divers“ | 1 | 3 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 |
| Skelettszintigraphie | 2 | 2 |
| Duplexsonographie | 6 | 8 |
| Bronchoskopie | 3 | 4 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>258 (6,0U/P)</i> | <i>250 (4,6U/P)</i> |

Anlage 5.23 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen I1 in Beziehung zu den Untersuchungen I1 gesamt

| Diagnostik I1 | Untersuchungen I1 gesamt (Pat. n=97) | Untersuchungen I1 als VK | % Anteil der VK in I1 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Röntgen Thorax | 606 | 209 | 34,5 |
| Röntgen NNH | 134 | 15 | 11,2 |
| Sono Abdomen | 102 | 10 | 9,8 |
| Echokardiographie | 97 | 10 | 10,3 |
| Lungenfunktion | 60 | 1 | 1,7 |
| Skelett Röntgen | 14 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 7 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 27 | 2 | 7,4 |
| CT Abdomen | 8 | 1 | 12,5 |
| CT Schädel | 26 | 5 | 19,2 |
| MRT Schädel | 4 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 4 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 14 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 7 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>1115 (11,5U/P)</i> | <i>253 (2,6U/P)</i> | <i>22,7</i> |

Anlage 5.24 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I1) | VK I1 OSHO ≤60J. (Pat.n=43) | VK I1 OSHO >60J. (Pat.n=54) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Röntgen Thorax | 81 | 128 |
| Röntgen NNH | 9 | 6 |
| Sono Abdomen | 5 | 5 |
| Echokardiographie | 9 | 1 |
| Lungenfunktion | 1 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 1 |
| CT Abdomen | 1 | 0 |
| CT Schädel | 2 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>109 (2,5U/P)</i> | <i>144 (2,7U/P)</i> |

Anlage 5.25 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I1 gesamt

| Diagnostik I1 | Screening I1 gesamt (Pat. n=97) | Screening I1 mit abw./path. Befunde | % Anteil der Screeninguntersuchungen I1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 100 | 63 | 63,0 |
| Röntgen NNH | 76 | 22 | 28,9 |
| Sono Abdomen | 67 | 43 | 64,2 |
| Echokardiographie | 58 | 33 | 56,9 |
| Lungenfunktion | 53 | 21 | 39,6 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>354</i> | <i>182</i> | <i>51,4</i> |

Anlage 5.26 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I1 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I1) | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Screening I1 | Screening I1 mit abw./path. Befunden | Screening I1 | Screening I1 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 47 | 23 | 53 | 40 |
| Röntgen NNH | 39 | 11 | 37 | 11 |
| Sono Abdomen | 33 | 20 | 34 | 23 |
| Echokardiographie | 27 | 10 | 31 | 23 |
| Lungenfunktion | 26 | 13 | 27 | 8 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>172 (4,0 U/P)</i> | <i>77 (44,8%)</i> | <i>182 (3,4 U/P)</i> | <i>105 (57,7%)</i> |

Anlage 5.27 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 gesamt

| Diagnostik I1 | Ereignisbez. Untersuchungen I1 gesamt (Pat. n=97) | Ereignisbez. Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der ereignisbez. Untersuchungen I1 mit abw./ path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 297 | 233 | 78,5 |
| Röntgen NNH | 43 | 26 | 60,5 |
| Sono Abdomen | 25 | 19 | 76,0 |
| Echokardiographie | 29 | 20 | 69,0 |
| Lungenfunktion | 6 | 2 | 33,3 |
| Skelett Röntgen | 14 | 11 | 78,6 |
| Röntgen Abdomen | 7 | 5 | 71,4 |
| CT Thorax | 25 | 23 | 92,0 |
| CT Abdomen | 7 | 6 | 85,7 |
| CT Schädel | 21 | 14 | 66,7 |
| MRT Schädel | 4 | 4 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 4 | 4 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelettszintigraphie | 4 | 2 | 50,0 |
| Duplexsonographie | 14 | 3 | 21,4 |
| Bronchoskopie | 7 | 6 | 85,7 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>508 (5,2U/P)</i> | <i>379</i> | <i>74,6</i> |

Anlage 5.28 Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I1 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I1) | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | ereignisbez. Untersuchung I1 | ereignisbez. Untersuchung I1 mit abw./ path. Befunden | ereignisbez. Untersuchung I1 | ereignisbez. Untersuchung I1 mit abw./ path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 160 | 128 | 137 | 105 |
| Röntgen NNH | 29 | 14 | 14 | 12 |
| Sono Abdomen | 15 | 10 | 10 | 9 |
| Echokardiographie | 13 | 7 | 16 | 13 |
| Lungenfunktion | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Skelett Röntgen | 1 | 0 | 13 | 11 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 3 | 4 | 2 |
| CT Thorax | 11 | 10 | 14 | 13 |
| CT Abdomen | 4 | 3 | 3 | 3 |
| CT Schädel | 7 | 4 | 14 | 10 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 3 | 3 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Duplexsonographie | 6 | 2 | 8 | 1 |
| Bronchoskopie | 3 | 3 | 4 | 3 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>258 (6,1U/P)</i> | <i>189 (73,2%)</i> | <i>250 (4,7U/P)</i> | <i>190 (76,0%)</i> |

**Anlage 5.29 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I1 mit
abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der
Verlaufskontrollen I1 gesamt**

| Diagnostik | VK I1 gesamt (Pat. n=97) | VK I1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der VK I1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 209 | 193 | 92,3 |
| Röntgen NNH | 15 | 15 | 100,0 |
| Sono Abdomen | 10 | 7 | 70,0 |
| Echokardiographie | 10 | 8 | 80,0 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 2 | 2 | 100,0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Schädel | 5 | 5 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>253 (5,9U/P)</i> | <i>232</i> | <i>91,7</i> |

**Anlage 5.30 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen I1 mit abw./path.
Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I1
gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.**

| Diagnostik (I1) | OSHO ≤60J. (Pat. n=43) | | OSHO >60J. (Pat. n=54) | |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | VK I1 | VK I1 mit abw./path. Befunden | VK I1 | VK I1 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 81 | 79 | 128 | 114 |
| Röntgen NNH | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Sono Abdomen | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Echokardiographie | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 2 | 2 | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>109 (2,5U/P)</i> | <i>102 (93,6%)</i> | <i>144 (3,7U/P)</i> | <i>130 (90,3%)</i> |

Anlage 5.31 Anzahl (absolut) der durchgeführten apparativen Untersuchungen der 2. Induktion (I2) in den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | Untersuchungen I2 OSHO ≤60J. (Pat. n=13) | Untersuchungen I2 OSHO >60J. (Pat. n=19) |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 35 | 82 |
| Röntgen NNH | 4 | 14 |
| Sono Abdomen | 2 | 3 |
| Echokardiographie | 2 | 5 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 3 |
| Röntgen Abdomen | 2 | 1 |
| CT Thorax | 2 | 1 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 4 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 1 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 2 | 3 |
| Bronchoskopie | 0 | 1 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>51 (3,9 U/P)</i> | <i>118 (6,2 U/P)</i> |

Anlage 5.32 Anzahl (absolut und %) der abw./path. Befunde in I2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen I2 gesamt.

| Diagnostik | Untersuchungen I2 gesamt (Pat. n=32) | Untersuchungen I2 mit abw. / path. Befunden | % Anteil der Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 117 | 80 | 68,4 |
| Röntgen NNH | 18 | 7 | 38,9 |
| Sono Abdomen | 5 | 5 | 100,0 |
| Echokardiographie | 7 | 5 | 71,4 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 5 | 4 | 80,0 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| CT Thorax | 3 | 2 | 66,7 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 4 | 3 | 75,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 5 | 3 | 60,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>169 (5,3U/P)</i> | <i>114</i> | <i>67,5%</i> |

Anlage 5.33 Anzahl (absolut) abweichender/path. Befunde I2 in den einzelnen Untersuchungen der Altersgruppen ≤60J. und >60J in Beziehung zur Anzahl der insgesamt durchgeführten Untersuchungen I2

| Diagnostik (I2) | OSHO ≤60J. (Pat. n=13) | | OSHO >60J. (Pat. n=19) | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| | Untersuchungen I2 gesamt | Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden | Untersuchungen I2 gesamt | Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 35 | 17 | 82 | 63 |
| Röntgen NNH | 4 | 1 | 14 | 6 |
| Sono Abdomen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Echokardiographie | 2 | 1 | 5 | 4 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Röntgen Abdomen | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CT Thorax | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 4 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>51 (3,9U/P)</i> | <i>27 (52,9%)</i> | <i>118 (6,2U/P)</i> | <i>87 (73,7%)</i> |

Anlage 5.34 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen I2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen I2 gesamt

| Diagnostik | Untersuchungen I2 gesamt (Pat. n=32) | Untersuchungen I2 als Screening | % Anteil der Screeninguntersuchungen I2 |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 117 | 13 | 11,1 |
| Röntgen NNH | 18 | 6 | 33,3 |
| Sono Abdomen | 5 | 1 | 20,0 |
| Echokardiographie | 7 | 2 | 28,6 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 5 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 3 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 4 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 5 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>169 (5,3U/P)</i> | <i>22 (0,7U/P)</i> | <i>13,0</i> |

Anlage 5.35 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | Screening I2 OSHO ≤60J. (Pat. n=13) | Screening I2 OSHO >60J. (Pat. n=19) |
|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 4 | 9 |
| Röntgen NNH | 1 | 5 |
| Sono Abdomen | 0 | 1 |
| Echokardiographie | 0 | 2 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>5 (0,4U/P)</i> | <i>17 (0,9U/P)</i> |

Anlage 5.36 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 gesamt

| Diagnostik I1 | Untersuchungen I2 gesamt (Pat. n=32) | Untersuchungen I2 ereignisbez. | % Anteil der ereignisbez. Untersuchung I2 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 117 | 73 | 62,4 |
| Röntgen NNH | 18 | 8 | 44,4 |
| Sono Abdomen | 5 | 3 | 60,0 |
| Echokardiographie | 7 | 4 | 57,1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 5 | 5 | 100,0 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| CT Thorax | 3 | 3 | 100,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 4 | 4 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 5 | 5 | 100,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>169 (5,3U/P)</i> | <i>110 (3,4U/P)</i> | <i>65,1</i> |

Anlage 5.37 Anzahl (absolut) ereignisbezogener Untersuchungen I2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | Ereignisbez. Untersuchung I2 OSHO ≤60J. (Pat.n=13) | Ereignisbez. Untersuchung I2 OSHO >60J. (Pat.n=19) |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 21 | 52 |
| Röntgen NNH | 2 | 6 |
| Sono Abdomen | 1 | 2 |
| Echokardiographie | 2 | 2 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 3 |
| Röntgen Abdomen | 2 | 1 |
| CT Thorax | 2 | 1 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 4 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 2 | 3 |
| Bronchoskopie | 0 | 1 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>34 (2,6U/P)</i> | <i>76 (4,0U/P)</i> |

Anlage 5.38 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen I2 in Beziehung zu den Untersuchungen I2 gesamt

| Diagnostik I2 | Untersuchungen I2 gesamt (Pat. n=32) | Untersuchungen I2 als VK | % Anteil der VK I2 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Röntgen Thorax | 117 | 31 | 26,5 |
| Röntgen NNH | 18 | 4 | 22,2 |
| Sono Abdomen | 5 | 1 | 20,0 |
| Echokardiographie | 7 | 1 | 14,3 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 5 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 3 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 4 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 5 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>169 (5,3U/P)</i> | <i>37 (1,2U/P)</i> | <i>21,9</i> |

Anlage 5.39 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | VK I2 OSHO ≤60J. (Pat.n=13) | VK I2 OSHO >60J. (Pat.n=19) |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Röntgen Thorax | 10 | 21 |
| Röntgen NNH | 1 | 3 |
| Sono Abdomen | 1 | 0 |
| Echokardiographie | 0 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>12 (0,9U/P)</i> | <i>25 (1,3U/P)</i> |

Anlage 5.40 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik I2 | Screening I2 gesamt (Pat. n=32) | Screening I2 mit abw./path. Befunden | % Anteil der Screeninguntersuchungen I2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 13 | 3 | 23,1 |
| Röntgen NNH | 6 | 1 | 16,7 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| Echokardiographie | 2 | 1 | 50,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>22 (0,7U/P)</i> | <i>6</i> | <i>27,3</i> |

Anlage 5.41 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen I2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | OSHO >60J. (Pat.n=13) | | OSHO >60J. (Pat.n=19) | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | Screening I2 | Screening I2 mit abw./path. Befunden | Screening I2 | Screening I2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Röntgen NNH | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Sono Abdomen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Echokardiographie | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | 5 (0,3U/P) | 1 (20,0%) | 17 (0,9U/P) | 5 (29,4) |

Anlage 5.42 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 gesamt

| Diagnostik I2 | Ereignisbez. Untersuchungen I2 gesamt (Pat. n=32) | Ereignisbez. Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden | % Anteil ereignisbez. Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 73 | 33 | 45,2 |
| Röntgen NNH | 8 | 5 | 62,5 |
| Sono Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| Echokardiographie | 4 | 1 | 25,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 5 | 4 | 80,0 |
| Röntgen Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| CT Thorax | 3 | 2 | 66,7 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 4 | 3 | 75,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 5 | 3 | 60,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | 110 (3,4U/P) | 59 | 53,6 |

Anlage 5.43 Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen I2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | OSHO >60J. (Pat.n=13) | | OSHO >60J. (Pat.n=19) | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Ereignisbez. Untersuchung I2 | Ereignisbez. Untersuchung I2 mit abw./path. Befunden | Ereignisbez. Untersuchung I2 | Ereignisbez. Untersuchung I2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 21 | 5 | 52 | 28 |
| Röntgen NNH | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Echokardiographie | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Röntgen Abdomen | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CT Thorax | 2 | 1 | 1 | 1 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 4 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gesamtanzahl | 34 (2,6U/P) | 14 (41,2%) | 76 (4,0U/P) | 45 (59,2%) |

Anlage 5.44 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I2 gesamt

| Diagnostik I2 | VK I2 gesamt (Pat. n=32) | VK I2 mit abw./path. Befunden | % Anteil der VK I2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 31 | 26 | 83,9 |
| Röntgen NNH | 4 | 1 | 25,0 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| Gesamtanzahl | 37 (1,2U/P) | 29 | 78,4 |

Anlage 5.45 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen I2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (I2) | OSHO >60J. (Pat.n=13) | | OSHO >60J. (Pat.n=19) | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | VK I2 gesamt | VK I2 mit abw./path. Befunden | VK I2 gesamt | VK I2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 10 | 8 | 21 | 18 |
| Röntgen NNH | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Echokardiographie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>12 (0,9U/P)</i> | <i>9 (75,0%)</i> | <i>25 (1,3U/P)</i> | <i>20 (80,0%)</i> |

Anlage 5.46 Anzahl (absolut) der durchgeführten apparativen Untersuchungen der 1. Konsolidierung (K1) in den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 OSHO ≤60J. (Pat. n=28) | Untersuchungen K1 OSHO >60J. (Pat. n=22) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 132 | 82 |
| Röntgen NNH | 21 | 9 |
| Sono Abdomen | 11 | 6 |
| Echokardiographie | 7 | 2 |
| Lungenfunktion | 0 | 1 |
| Skelett Röntgen | 1 | 9 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 0 |
| CT Thorax | 7 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 2 |
| CT Schädel | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 1 |
| MRT „divers“ | 0 | 2 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 7 | 3 |
| Bronchoskopie | 2 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>195 (6,7U/P)</i> | <i>120 (5,5 U/P)</i> |

**Anlage 5.47 Anzahl (absolut und %) der abw./path. Befunde in K1 in
Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen K1 gesamt.**

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 gesamt (Pat. n=50) | Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 214 | 127 | 59,3 |
| Röntgen NNH | 30 | 21 | 70,0 |
| Sono Abdomen | 17 | 12 | 70,6 |
| Echokardiographie | 9 | 8 | 88,9 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelett Röntgen | 10 | 7 | 70,0 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 2 | 50,0 |
| CT Thorax | 7 | 7 | 100,0 |
| CT Abdomen | 2 | 1 | 50,0 |
| CT Schädel | 6 | 3 | 50,0 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 10 | 7 | 70,0 |
| Bronchoskopie | 2 | 2 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>315 (6,3U/P)</i> | <i>201</i> | <i>63,8</i> |

**Anlagen 5.48 Anzahl (absolut) abweichender/path. Befunde K1 in den einzelnen
Untersuchungen der beiden Altersgruppen in Beziehung zu der
Anzahl der insgesamt durchgeführten Untersuchungen K1**

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 OSHO ≤60J. (Pat. n=28) | | Untersuchungen K1 OSHO >60J. (Pat. n=22) | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Untersuchungen K1 gesamt | Untersuchungen K1 mit abw./ path. Befunden | Untersuchungen K1 gesamt | Untersuchungen K1 mit abw./ path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 132 | 72 | 82 | 55 |
| Röntgen NNH | 21 | 14 | 9 | 7 |
| Sono Abdomen | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Echokardiographie | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skelett Röntgen | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 7 | 7 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CT Schädel | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Bronchoskopie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>195 (6,7U/P)</i> | <i>118 (60,5%)</i> | <i>120 (5,5U/P)</i> | <i>83 (69,2%)</i> |

Anlage 5.49 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen K1 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen K1 gesamt

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 gesamt (Pat. n=50) | Untersuchungen K1 als Screening | % Anteil der Screeninguntersuchungen K1 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 214 | 24 | 11,2 |
| Röntgen NNH | 30 | 8 | 26,7 |
| Sono Abdomen | 17 | 2 | 11,7 |
| Echokardiographie | 9 | 2 | 22,2 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelett Röntgen | 10 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 7 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 2 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 6 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 1 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 10 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 2 | 0 | 0,0 |
| Gesamtanzahl | 315 (6,3U/P) | 37 (0,7U/P) | 11,7 |

Anlage 5.50 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Screening K1 OSHO ≤60J. (Pat.n=28) | Screening K1 OSHO >60J. (Pat.n=22) |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 16 | 8 |
| Röntgen NNH | 5 | 3 |
| Sono Abdomen | 0 | 2 |
| Echokardiographie | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 1 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| Gesamtanzahl | 22 (0,8U/P) | 15 (0,7U/P) |

Anlage 5.51 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K1 gesamt

| Diagnostik K1 | Untersuchungen K1 gesamt (Pat. n=50) | Untersuchungen K1 ereignisbez. | % Anteil der ereignisbez. Untersuchung K1 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 214 | 125 | 58,4 |
| Röntgen NNH | 30 | 12 | 40,0 |
| Sono Abdomen | 17 | 12 | 70,6 |
| Echokardiographie | 9 | 5 | 55,6 |
| Lungenfunktion | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 10 | 9 | 90,0 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 4 | 100,0 |
| CT Thorax | 7 | 6 | 85,7 |
| CT Abdomen | 2 | 2 | 100,0 |
| CT Schädel | 6 | 6 | 100,0 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 10 | 7 | 70,0 |
| Bronchoskopie | 2 | 2 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>315 (6,3U/P)</i> | <i>193 (3,9U/P)</i> | <i>61,3</i> |

Anlage 5.52 Anzahl (absolut) ereignisbezogener Untersuchungen K1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Ereignisbez. Untersuchung K1 OSHO ≤60J. (Pat.n=28) | Ereignisbez. Untersuchung K1 OSHO >60J. (Pat.n=22) |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 78 | 47 |
| Röntgen NNH | 7 | 5 |
| Sono Abdomen | 8 | 4 |
| Echokardiographie | 4 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 1 | 8 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 0 |
| CT Thorax | 6 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 2 |
| CT Schädel | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 1 |
| MRT „divers“ | 0 | 2 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 3 |
| Bronchoskopie | 2 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>117 (4,2U/P)</i> | <i>76 (3,5U/P)</i> |

Anlage 5.53 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen K1 in Beziehung zu den Untersuchungen K1 gesamt

| Diagnostik K1 | Untersuchungen K1 gesamt (Pat. n=50) | Untersuchungen K1 als VK | % Anteil der VK K1 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Röntgen Thorax | 214 | 65 | 30,4 |
| Röntgen NNH | 30 | 10 | 33,3 |
| Sono Abdomen | 17 | 3 | 17,6 |
| Echokardiographie | 9 | 2 | 22,2 |
| Lungenfunktion | 1 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 10 | 1 | 10,0 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 7 | 1 | 14,3 |
| CT Abdomen | 2 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 6 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 1 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 10 | 3 | 30,0 |
| Bronchoskopie | 2 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>315 (6,3U/P)</i> | <i>85 (1,7U/P)</i> | <i>27,0</i> |

Anlage 5.54 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K1 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | VK K1 OSHO ≤60J. (Pat.n=28) | VK K1 OSHO >60J. (Pat.n=22) |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Röntgen Thorax | 38 | 27 |
| Röntgen NNH | 9 | 1 |
| Sono Abdomen | 3 | 0 |
| Echokardiographie | 2 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 3 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>56 (2,0U/P)</i> | <i>29 (1,3U/P)</i> |

Anlage 5.55 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K1 gesamt

| Diagnostik K1 | Screening K1 gesamt (Pat. n=50) | Screening K1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der Screening- untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 24 | 10 | 41,7 |
| Röntgen NNH | 8 | 5 | 62,5 |
| Sono Abdomen | 2 | 2 | 100,0 |
| Echokardiographie | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenfunktion | 1 | 1 | 100,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>37 (0,7U/P)</i> | <i>20</i> | <i>54,1</i> |

Anlage 5.56 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K1 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 OSHO ≤60J. (Pat. n=28) | | Untersuchungen K1 OSHO >60J. (Pat. n=22) | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Screening K1 | Screening K1 mit abw./path. Befunden | Screening K1 | Screening K1 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 16 | 6 | 8 | 4 |
| Röntgen NNH | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Sono Abdomen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>22 (0,8U/P)</i> | <i>10 (45,5%)</i> | <i>15 (0,7U/P)</i> | <i>10 (66,7%)</i> |

Anlage 5.57 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K1 gesamt

| Diagnostik K1 | Ereignisbez. Untersuchungen K1 gesamt (Pat. n=50) | Ereignisbez. Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunde | % Anteil der ereignisbez. Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 125 | 59 | 47,2 |
| Röntgen NNH | 12 | 8 | 66,7 |
| Sono Abdomen | 12 | 7 | 58,3 |
| Echokardiographie | 5 | 4 | 80,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 9 | 7 | 77,7 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 2 | 50,0 |
| CT Thorax | 6 | 6 | 100,0 |
| CT Abdomen | 2 | 1 | 50,0 |
| CT Schädel | 6 | 3 | 50,0 |
| MRT Schädel | 1 | 1 | 100,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 7 | 4 | 57,1 |
| Bronchoskopie | 2 | 2 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>193 (3,9U/P)</i> | <i>106</i> | <i>54,9</i> |

Anlage 5.58 Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen gesamt K1 bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 OSHO ≤60J. (Pat. n=28) | | Untersuchungen K1 OSHO >60J. (Pat. n=22) | |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Ereignisbez. Untersuchung K1 | Ereignisbez. Untersuchung K1 mit abw./path. Befunde | Ereignisbez. Untersuchung K1 | Ereignisbez. Untersuchung K1 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 78 | 43 | 47 | 16 |
| Röntgen NNH | 7 | 4 | 5 | 4 |
| Sono Abdomen | 8 | 6 | 4 | 1 |
| Echokardiographie | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Röntgen Abdomen | 4 | 2 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 6 | 6 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CT Schädel | 3 | 0 | 3 | 3 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Bronchoskopie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>117 (4,2U/P)</i> | <i>70 (59,8%)</i> | <i>76 (3,5U/P)</i> | <i>36 (47,4%)</i> |

Anlage 5.59 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K1 gesamt

| Diagnostik K1 | VK K1 gesamt (Pat. n=50) | VK K1 mit abw./path. Befunden | % Anteil der VK K1 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 65 | 58 | 89,2 |
| Röntgen NNH | 10 | 8 | 80,0 |
| Sono Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| Echokardiographie | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 1 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 3 | 3 | 100,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>85 (1,7U/P)</i> | <i>75</i> | <i>88,2</i> |

Anlage 5.60 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K1 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K1 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K1) | Untersuchungen K1 OSHO ≤60J. (Pat. n=28) | | Untersuchungen K1 OSHO >60J. (Pat. n=22) | |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | VK K1 gesamt | VK K1 mit abw./ path. Befunden | VK K1 gesamt | VK K1 mit abw./ path. Befunde (Pat.n=10) |
| Röntgen Thorax | 38 | 32 | 27 | 26 |
| Röntgen NNH | 9 | 7 | 1 | 1 |
| Sono Abdomen | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Echokardiographie | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>56 (2,0U/P)</i> | <i>48 (85,7%)</i> | <i>29 (1,3U/P)</i> | <i>27 (93,1%)</i> |

Anlage 5.61 Anzahl (absolut) der durchgeführten apparativen Untersuchungen der 2. Konsolidierung (K2) in den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat. n=16) | Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat. n=14) |
|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 52 | 42 |
| Röntgen NNH | 5 | 3 |
| Sono Abdomen | 5 | 2 |
| Echokardiographie | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 0 |
| CT Abdomen | 1 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 2 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 1 | 2 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 3 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>73 (4,6U/P)</i> | <i>56 (4,0U/P)</i> |

Anlage 5.62 Anzahl (absolut und %) der abw./path. Befunde in K2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 gesamt (Pat. n=30) | Untersuchungen K2 mit abw./path. Befunden | % Anteil der Untersuchungen K2 mit abw./path. Befunde |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 94 | 47 | 50,0 |
| Röntgen NNH | 8 | 4 | 50,0 |
| Sono Abdomen | 7 | 5 | 71,4 |
| Echokardiographie | 2 | 2 | 100 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 3 | 2 | 66,7 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Schädel | 2 | 2 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 3 | 3 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 7 | 4 | 57,1 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>129 (4,3U/P)</i> | <i>72</i> | <i>55,8</i> |

Anlage 5.63 Anzahl (absolut) abw./path. Befunde K2 in den einzelnen Untersuchungen der Altersgruppen ≤60J. und >60J. in Beziehung zu der Anzahl der insgesamt durchgeführten Untersuchungen K2

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat. n=16) | | Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat. n=14) | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | Untersuchungen K2 gesamt | Untersuchungen K2 mit abw./ path. Befunden | Untersuchungen K2 gesamt | Untersuchungen K2 mit abw./ path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 52 | 25 | 42 | 22 |
| Röntgen NNH | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Sono Abdomen | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>73 (4,6U/P)</i> | <i>41 (56,2%)</i> | <i>56 (4,0U/P)</i> | <i>31 (55,4%)</i> |

Anlage 5.64 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen K2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Untersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 gesamt (Pat. n=30) | Untersuchungen K2 als Screening | % Anteil der Screening- untersuchungen K2 |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 94 | 7 | 7,4 |
| Röntgen NNH | 8 | 2 | 25,0 |
| Sono Abdomen | 7 | 2 | 28,6 |
| Echokardiographie | 2 | 1 | 50,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 3 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 1 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 2 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 3 | 0 | 0,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 7 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>129 (4,3U/P)</i> | <i>12 (0,4U/P)</i> | <i>9,3</i> |

Anlage 5.65 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | Screening K2 OSHO ≤60J. (Pat.n=16) | Screening K2 OSHO >60J. (Pat.n=14) |
|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 4 | 3 |
| Röntgen NNH | 2 | 0 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 |
| Echokardiographie | 0 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>7 (0,4U/P)</i> | <i>5 (0,4U/P)</i> |

Anlage 5.66 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik K2 | Untersuchungen K2 gesamt (Pat. n=30) | Untersuchungen K2 ereignisbez. | % Anteil der ereignisbez. Untersuchungen K2 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 94 | 58 | 61,7 |
| Röntgen NNH | 8 | 5 | 62,5 |
| Sono Abdomen | 7 | 3 | 42,9 |
| Echokardiographie | 2 | 0 | 0,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 3 | 3 | 100,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Abdomen | 1 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 2 | 2 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 3 | 2 | 66,7 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 7 | 6 | 85,7 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>129 (4,3U/P)</i> | <i>82 (2,7U/P)</i> | <i>63,6</i> |

Anlage 5.67 Anzahl (absolut) ereignisbezogener Untersuchungen K2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | Ereignisbez. Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat.n=16) | Ereignisbez. Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat.n=14) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 35 | 23 |
| Röntgen NNH | 3 | 2 |
| Sono Abdomen | 3 | 1 |
| Echokardiographie | 0 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 2 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 3 | 3 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>49 (3,1U/P)</i> | <i>33 (2,4U/P)</i> |

Anlage 5.68 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen K2 in Beziehung zu den Untersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik K2 | Untersuchungen K2 gesamt (Pat. n=30) | Untersuchungen K2 als VK | % Anteil der VK K2 |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Röntgen Thorax | 94 | 29 | 30,9 |
| Röntgen NNH | 8 | 1 | 12,5 |
| Sono Abdomen | 7 | 1 | 14,3 |
| Echokardiographie | 2 | 1 | 50,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 3 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Schädel | 2 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 3 | 1 | 33,3 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 7 | 1 | 14,3 |
| Bronchoskopie | 1 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>129 (4,3U/P)</i> | <i>35 (1,2U/P)</i> | <i>27,1</i> |

Anlage 5.69 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K2 der Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | VK K2 OSHO ≤60J. (Pat.n=16) | VK K2 OSHO >60J. (Pat.n=14) |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Röntgen Thorax | 16 | 13 |
| Röntgen NNH | 1 | 0 |
| Sono Abdomen | 0 | 1 |
| Echokardiographie | 1 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 1 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 1 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 1 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>20 (1,3U/P)</i> | <i>15 (1,1U/P)</i> |

Anlage 5.70 Anzahl (absolut und %) der Screeninguntersuchungen K2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik K2 | Screening K2 gesamt (Pat. n=30) | Screening K2 mit abw./path. Befunden | % Anteil der Screening- untersuchungen K2 mit abw./path. Befunde |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 7 | 4 | 57,1 |
| Röntgen der NNH | 2 | 1 | 50,0 |
| Sono Abdomen | 2 | 1 | 50,0 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenzintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>12 (0,4U/P)</i> | <i>7</i> | <i>58,3</i> |

Anlage 5.71 Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Screeninguntersuchungen K2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat. n=16) | | Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat. n=14) | |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | Screening K2 | Screening K2 mit abw./path. Befunden | Screening K2 | Screening K2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Röntgen NNH | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sono Abdomen | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Echokardiographie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>6 (0,4U/P)</i> | <i>4 (66,6%)</i> | <i>6 (0,4U/P)</i> | <i>3 (50,0%)</i> |

Anlage 5.72 Anzahl (absolut und %) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 gesamt

| Diagnostik K2 | Ereignisbez. Untersuchungen K2 gesamt (Pat. n=30) | Ereignisbez. Untersuchungen K2 mit abw./path.Befunden | % Anteil ereignisbez. Untersuchungen K2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 58 | 15 | 25,9 |
| Röntgen NNH | 5 | 2 | 40,0 |
| Sono Abdomen | 3 | 3 | 100,0 |
| Echokardiographie | 0 | 0 | 0,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 3 | 2 | 66,7 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Schädel | 2 | 2 | 100,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 2 | 2 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 6 | 3 | 50,0 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 100,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>82 (0,4U/P)</i> | <i>31</i> | <i>37,8</i> |

Anlage 5.73 Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der ereignisbezogenen Untersuchungen K2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat. n=16) | | Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat. n=14) | |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | Ereignisbez. Untersuchung K2 | Ereignisbez. Untersuchung K2 mit abw./ path. Befunden | Ereignisbez. Untersuchung K2 | Ereignisbez. Untersuchung K2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 35 | 8 | 23 | 7 |
| Röntgen NNH | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Sono Abdomen | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Echokardiographie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 2 | 2 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Bronchoskopie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>49 (3,1U/P)</i> | <i>17(34,7%)</i> | <i>33 (2,4U/P)</i> | <i>14 (42,4%)</i> |

Anlage 5.74 Anzahl (absolut und %) der Verlaufskontrollen K2 mit abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K2 gesamt

| Diagnostik K2 | VK K2 gesamt (Pat. n=30) | VK K2 mit abw./path. Befunde | % Anteil der VK K2 mit abw./path. Befunden |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Röntgen Thorax | 29 | 28 | 96,6 |
| Röntgen NNH | 1 | 1 | 100,0 |
| Sono Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0,0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0,0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 100,0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0,0 |
| MRT „divers“ | 1 | 1 | 100,0 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0,0 |
| Duplexsonographie | 1 | 1 | 100,0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0,0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>35 (1,2U/P)</i> | <i>34</i> | <i>97,1</i> |

**Anlage 5.75 Anzahl (absolut) der Verlaufskontrollen K2 mit
abw./path. Befunden in Beziehung zur Anzahl (absolut) der
Verlaufskontrollen K2 gesamt bei den Altersgruppen ≤60J. und >60J.**

| Diagnostik (K2) | Untersuchungen K2 OSHO ≤60J. (Pat. n=16) | | Untersuchungen K2 OSHO >60J. (Pat. n=14) | |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| | VK K2 gesamt | VK K2 mit abw./path. Befunden | VK K2 gesamt | VK K2 mit abw./path. Befunden |
| Röntgen Thorax | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Röntgen NNH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sono Abdomen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Echokardiographie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lungenfunktion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelett Röntgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Röntgen Abdomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Thorax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CT Abdomen | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT Schädel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MRT „divers“ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lungenszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skelettszintigraphie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplexsonographie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bronchoskopie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Gesamtanzahl</i> | <i>20 (1,3U/P)</i> | <i>19 (95,0%)</i> | <i>15 (1,1U/P)</i> | <i>15 (100,0%)</i> |

Anlage 5.76 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der apparativen Diagnostik in Bezug zur zytogenetischen Risikokonstellation

| | Cyto_v_Therapie | N | Mittlerer Rang |
|-----------------|--------------------------|----|-------------------|
| Diagnostik_Cyto | prognostisch günstig | 8 | 31,44 |
| | prognostisch intermediär | 50 | 38,55 |
| | prognostisch ungünstig | 22 | 48,23 |
| | Gesamt | 80 | nicht signifikant |

Anlage 5.77 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der Screeninguntersuchungen und „ereignisbezogenen“ Diagnostik in Bezug zur zytogenetischen Risikokonstellation

| | Cyto_v_Therapie | N | Mittlerer Rang |
|----------------|--------------------------|----|-------------------|
| Screening_Cyto | prognostisch günstig | 8 | 35,75 |
| | prognostisch intermediär | 50 | 41,55 |
| | prognostisch ungünstig | 22 | 39,84 |
| | Gesamt | 80 | nicht signifikant |

| | Cyto_v_Therapie | N | Mittlerer Rang |
|---------------|--------------------------|----|-------------------|
| Ereignis_Cyto | prognostisch günstig | 8 | 31,75 |
| | prognostisch intermediär | 50 | 40,80 |
| | prognostisch ungünstig | 22 | 43,00 |
| | Gesamt | 80 | nicht signifikant |

Anlage 5.78 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der abw./path. Screeningbefunde und abw./path. Befunde der „ereignisbezogenen“ Diagnostik in Bezug zur zytogenetischen Risikokonstellation

| | Cyto_v_Therapie | N | Mittlerer Rang |
|---------------------|--------------------------|----|-------------------|
| Screening_path_Cyto | prognostisch günstig | 8 | 28,94 |
| | prognostisch intermediär | 50 | 38,91 |
| | prognostisch ungünstig | 22 | 48,32 |
| | Gesamt | 80 | nicht signifikant |

| | Cyto_v_Therapie | N | Mittlerer Rang |
|-----------------------|--------------------------|----|-------------------|
| Ereignisbez_path_Cyto | prognostisch günstig | 8 | 37,94 |
| | prognostisch intermediär | 50 | 39,15 |
| | prognostisch ungünstig | 22 | 44,50 |
| | Gesamt | 80 | nicht signifikant |

Anlage 5.79 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der Screeninguntersuchungen vor Therapiebeginn in Bezug auf Fieber vor Therapie (I1)

| | Fieber_vor_I1 | N | Mittlerer Rang |
|------------------|---------------|----|-------------------|
| Screening_vor_I1 | nein | 71 | 50,02 |
| | ja | 26 | 46,21 |
| | Gesamt | 97 | nicht signifikant |

Anlage 5.80 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der Verlaufskontrollen vor Therapiebeginn in Bezug auf Fieber vor Therapie

| | Fieber_vor_I1 | N | Mittlerer Rang |
|--------------------------|---------------|----|-------------------|
| Verlaufskontrolle_vor_I1 | nein | 71 | 47,68 |
| | ja | 26 | 52,60 |
| | Gesamt | 97 | nicht signifikant |

Anlage 5.81 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der abw./path. Screeningbefunde vor Therapiebeginn in Bezug auf Fieber vor Therapie

| | Fieber_vor_I1 | N | Mittlerer Rang |
|-----------------------|---------------|----|-------------------|
| Screening_path_vor_I1 | nein | 67 | 48,08 |
| | ja | 23 | 51,50 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |

Anlage 5.82 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der abw./path. Verlaufskontrollen vor Therapiebeginn in Bezug auf Fieber vor Therapie

| | Fieber_vor_I1 | N | Mittlerer Rang |
|-------------------------------|---------------|----|-------------------|
| Verlaufskontrolle_path_vor_I1 | nein | 71 | 47,59 |
| | ja | 26 | 52,85 |
| | Gesamt | 97 | nicht signifikant |

Anlage 5.83 Zusammenhang zwischen der Leukopeniedauer (I1-K2) und dem Alter der Patienten

1= OSHO ≤ 60 Jahre

2= OSHO > 60 Jahre

| | | | Leukopeniedauer I1 | | Gesamt |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | LP I1 <20d | LP I1 ≥20d | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 17 | 26 | 43 |
| | | % von Altersklassen | 39,5% | 60,5% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 25 | 22 | 47 |
| | | % von Altersklassen | 53,2% | 46,8% | 100,0% |
| Gesamt | | Anzahl | 42 | 48 | 90 |
| nicht signifikant | | % von Altersklassen | 46,7% | 53,3% | 100,0% |

| | | | Leukopeniedauer I2 | | Gesamt |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | LP I2 <20d | LP I2 ≥20d | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 8 | 5 | 13 |
| | | % von Altersklassen | 61,5% | 38,5% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 7 | 12 | 19 |
| | | % von Altersklassen | 36,8% | 63,2% | 100,0% |
| Gesamt | | Anzahl | 15 | 17 | 32 |
| nicht signifikant | | % von Altersklassen | 46,9% | 53,1% | 100,0% |

| | | | Leukopeniedauer K1 | | Gesamt |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | LP K1 <20d | LP K1 ≥20d | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 14 | 15 | 29 |
| | | % von Altersklassen | 48,3% | 51,7% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 9 | 12 | 21 |
| | | % von Altersklassen | 42,9% | 57,1% | 100,0% |
| Gesamt | | Anzahl | 23 | 27 | 50 |
| nicht signifikant | | % von Altersklassen | 46,0% | 54,0% | 100,0% |

| | | | Leukopeniedauer K2 | | Gesamt |
|-------------------|---|---------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | LP K2 <20d | LP K2 ≥20d | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 8 | 8 | 16 |
| | | % von Altersklassen | 50,0% | 50,0% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 9 | 5 | 14 |
| | | % von Altersklassen | 64,3% | 35,7% | 100,0% |
| Gesamt | | Anzahl | 17 | 13 | 30 |
| nicht signifikant | | % von Altersklassen | 56,7% | 43,3% | 100,0% |

Anlage 5.84 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der Diagnostik in I1, K1, K2 sowie Häufigkeit (als mittlerer Rang) abw./path. Befunde in Bezug zur Leukopeniedauer

| | Leukopeniedauer I1 | N | Mittlerer Rang |
|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| Diagnostik_I1 | <20d | 42 | 41,27 |
| | >=20d | 48 | 49,20 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |
| Path_Befunde_I1 | <20d | 42 | 43,82 |
| | >=20d | 48 | 46,97 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K1 | N | Mittlerer Rang |
|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| Diagnostik_K1 | <20d | 23 | 25,63 |
| | >=20d | 27 | 25,39 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |
| Path_Befunde_K1 | <20d | 23 | 25,57 |
| | >=20d | 27 | 25,44 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K2 | N | Mittlerer Rang |
|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| Diagnostik_K2 | <20d | 17 | 14,65 |
| | >=20d | 13 | 16,62 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |
| Path_Befunde_K2 | <20d | 17 | 14,44 |
| | >=20d | 13 | 16,88 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |

Anlage 5.85 Häufigkeit (als mittlerer Rang) abw./path. Befunde I2 in Bezug zur Leukopeniedauer I2

| | Leukopeniedauer I2 | N | Mittlerer Rang |
|-----------------|--------------------|----|-------------------|
| Path_Befunde_I2 | <20d | 15 | 14,23 |
| | >=20d | 17 | 18,50 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |

**Anlage 5.86 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der apparativen Diagnostik (I1-K2)
nach Indikationsstellung in Bezug zur Leukopeniedauer**

| | Leukopeniedauer I1 | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------------------|----|-------------------|
| Screening_I1 | <20d | 42 | 42,61 |
| | >=20d | 48 | 48,03 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |
| Ereignisse_I1 | <20d | 42 | 43,98 |
| | >=20d | 48 | 46,83 |
| | Gesamt | 90 | |
| Verlaufskontrolle_I1 | <20d | 42 | 40,80 |
| | >=20d | 48 | 49,61 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer I2 | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------------------|----|-------------------|
| Ereignisse_I2 | <20d | 15 | 14,67 |
| | >=20d | 17 | 18,12 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_I2 | <20d | 15 | 13,73 |
| | >=20d | 17 | 18,94 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K1 | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------------------|----|-------------------|
| Screening_K1 | <20d | 23 | 27,07 |
| | >=20d | 27 | 24,17 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |
| Ereignisse_K1 | <20d | 23 | 24,72 |
| | >=20d | 27 | 26,17 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_K1 | <20d | 23 | 24,65 |
| | >=20d | 27 | 26,22 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K2 | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------------------|----|-------------------|
| Ereignisse_K2 | <20d | 17 | 13,56 |
| | >=20d | 13 | 18,04 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_K2 | <20d | 17 | 14,97 |
| | >=20d | 13 | 16,19 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |

Anlage 5.87 Häufigkeit (als mittlerer Rang) abw./path.Befunde der apparativen Diagnostik (I1-K2) nach Indikationsstellung in Bezug zur Leukopeniedauer

| | Leukopeniedauer I1 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|--------------------|----|-------------------|
| Screening_path_I1 | <20d | 42 | 43,24 |
| | >=20d | 48 | 47,48 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |
| Ereignisbez._path_I1 | <20d | 42 | 44,76 |
| | >=20d | 48 | 46,15 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_I1 | <20d | 42 | 41,83 |
| | >=20d | 48 | 48,71 |
| | Gesamt | 90 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer I2 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|--------------------|----|-------------------|
| Screening_path_I2 | <20d | 15 | 16,07 |
| | >=20d | 17 | 16,88 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_I2 | <20d | 15 | 14,23 |
| | >=20d | 17 | 18,50 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_I2 | <20d | 15 | 15,03 |
| | >=20d | 17 | 17,79 |
| | Gesamt | 32 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K1 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|--------------------|----|-------------------|
| Screening_path_K1 | <20d | 23 | 27,20 |
| | >=20d | 27 | 24,06 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_K1 | <20d | 23 | 26,26 |
| | >=20d | 27 | 24,85 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_K1 | <20d | 23 | 25,02 |
| | >=20d | 27 | 25,91 |
| | Gesamt | 50 | nicht signifikant |

| | Leukopeniedauer K2 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|--------------------|----|-------------------|
| Ereignisbez_path_K2 | <20d | 17 | 13,38 |
| | >=20d | 13 | 18,27 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_K2 | <20d | 17 | 14,94 |
| | >=20d | 13 | 16,23 |
| | Gesamt | 30 | nicht signifikant |

Anlage 5.88 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der apparativen Diagnostik und abw./path. Befunde in (I1-K2) in Bezug auf das Therapieergebnis

| Therapieergebnis I1 | | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------|----|-------------------|
| Diagnostik_I1 | CR | 32 | 40,80 |
| | PR | 23 | 29,43 |
| | Rez. | 16 | 35,84 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |
| Abw./path_Befunde_I1 | CR | 32 | 37,55 |
| | PR | 23 | 31,48 |
| | Rez. | 16 | 39,41 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |

| Therapieergebnis I2 | | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------|----|-------------------|
| Diagnostik_I2 | CR | 12 | 16,83 |
| | PR | 12 | 11,79 |
| | Rez. | 4 | 15,63 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Abw./path_Befunde_I2 | CR | 12 | 15,54 |
| | PR | 12 | 12,88 |
| | Rez. | 4 | 16,25 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |

| Therapieergebnis K1 | | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|--------|----|-------------------|
| Diagnostik_K1 | CR | 27 | 23,78 |
| | PR | 12 | 21,46 |
| | Rez. | 5 | 18,10 |
| | Gesamt | 44 | nicht signifikant |
| Abw./path_Befunde_K1 | CR | 27 | 23,33 |
| | PR | 12 | 22,00 |
| | Rez. | 5 | 19,20 |
| | Gesamt | 44 | nicht signifikant |

| Therapieergebnis K2 | | N | Mittlerer Rang |
|---------------------|--------|----|-------------------|
| Diagnostik_K2 | CR | 17 | 15,15 |
| | PR | 6 | 10,50 |
| | Rez. | 6 | 19,08 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |

Anlage 5.89 Häufigkeit (als mittlerer Rang) der apparativen Diagnostik (I1-K2) nach Indikationsstellung in Bezug zum Therapieergebnis

| | Therapieergebnis I1 | N | Mittlerer Rang |
|----------------------|---------------------|----|-------------------|
| Screening_I1 | CR | 32 | 37,80 |
| | PR | 23 | 39,02 |
| | Rez. | 16 | 28,06 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_I1 | CR | 32 | 37,23 |
| | PR | 23 | 31,41 |
| | Rez. | 16 | 40,13 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |
| | Therapieergebnis I2 | N | Mittlerer Rang |
| Screening_I2 | CR | 12 | 14,83 |
| | PR | 12 | 13,67 |
| | Rez. | 4 | 16,00 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_I2 | CR | 12 | 14,46 |
| | PR | 12 | 14,00 |
| | Rez. | 4 | 16,13 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| | Therapieergebnis K1 | N | Mittlerer Rang |
| Screening_K1 | CR | 27 | 22,85 |
| | PR | 12 | 24,33 |
| | Rez. | 5 | 16,20 |
| | Gesamt | 44 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_K1 | CR | 27 | 23,74 |
| | PR | 12 | 20,25 |
| | Rez. | 5 | 21,20 |
| | Gesamt | 44 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_K1 | CR | 27 | 23,24 |
| | PR | 12 | 22,67 |
| | Rez. | 5 | 18,10 |
| | Gesamt | 44 | nicht signifikant |
| | Therapieergebnis K2 | N | Mittlerer Rang |
| Screening_K2 | CR | 17 | 16,79 |
| | PR | 6 | 11,92 |
| | Rez. | 6 | 13,00 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_K2 | CR | 17 | 15,29 |
| | PR | 6 | 10,92 |
| | Rez. | 6 | 18,25 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_K2 | CR | 17 | 14,65 |
| | PR | 6 | 12,50 |
| | Rez. | 6 | 18,50 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |

Anlage 5.90 Häufigkeit (als mittlerer Rang) abw./path. Befunde der apparativen Diagnostik (I1-K1) nach Indikationsstellung in Bezug zum Therapieergebnis

| | Therapieergebnis I1 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|---------------------|----|-------------------|
| Screening_path_I1 | CR | 32 | 36,56 |
| | PR | 23 | 35,89 |
| | Rez. | 16 | 35,03 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_I1 | CR | 32 | 38,27 |
| | PR | 23 | 31,41 |
| | Rez. | 16 | 38,06 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_I1 | CR | 32 | 36,83 |
| | PR | 23 | 32,04 |
| | Rez. | 16 | 40,03 |
| | Gesamt | 71 | nicht signifikant |

| | Therapieergebnis I2 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|---------------------|----|-------------------|
| Screening_path_I2 | CR | 12 | 14,25 |
| | PR | 12 | 13,13 |
| | Rez. | 4 | 19,38 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_I2 | CR | 12 | 17,25 |
| | PR | 12 | 12,50 |
| | Rez. | 4 | 12,25 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_I2 | CR | 12 | 12,92 |
| | PR | 12 | 16,04 |
| | Rez. | 4 | 14,63 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |

| | Therapieergebnis K1 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|---------------------|----|-------------------|
| Screening_path_K1 | CR | 12 | 22,76 |
| | PR | 12 | 24,83 |
| | Rez. | 4 | 15,50 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_K1 | CR | 12 | 23,13 |
| | PR | 12 | 21,29 |
| | Rez. | 4 | 22,00 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_K1 | CR | 12 | 22,94 |
| | PR | 12 | 22,75 |
| | Rez. | 4 | 19,50 |
| | Gesamt | 28 | nicht signifikant |

Anlage 5.91 Häufigkeit (als mittlerer Rang) abw./path. Befunde der apparativen Diagnostik (K2) nach Indikationsstellung in Bezug zum Therapieergebnis

| | Therapieergebnis K2 | N | Mittlerer Rang |
|---------------------------|---------------------|----|-------------------|
| Screening_path_K2 | CR | 17 | 15,68 |
| | PR | 6 | 11,83 |
| | Rez. | 6 | 16,25 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |
| Ereignisbez_path_K2 | CR | 17 | 14,59 |
| | PR | 6 | 11,83 |
| | Rez. | 6 | 19,33 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |
| Verlaufskontrolle_path_K2 | CR | 17 | 14,65 |
| | PR | 6 | 12,50 |
| | Rez. | 6 | 18,50 |
| | Gesamt | 29 | nicht signifikant |

Anlage 6.1 Beziehung zwischen zytogenetischer Risikogruppe und den Altersklassen ≤ 60 Jahre und > 60 Jahre

1= OSHO ≤ 60 Jahre

2= OSHO > 60 Jahre

| | | | Cyto_v_Therapie | | | Gesamt |
|-------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| | | | prognostisch günstig | prognostisch intermediär | prognostisch ungünstig | |
| Altersklassen | 1 | Anzahl | 3 | 26 | 10 | 39 |
| | | % von Altersklassen | 7,7% | 66,7% | 25,6% | 100,0% |
| | 2 | Anzahl | 5 | 24 | 12 | 41 |
| | | % von Altersklassen | 12,2% | 58,5% | 29,3% | 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtanzahl | 8 | 50 | 22 | 80 |
| | | % von Altersklassen | 10,0% | 62,5% | 27,5% | 100,0% |

Anlage 6.2 Beziehung zwischen Fieber vor Therapiebeginn und dem Therapieergebnis I1

| | | | Therapieergebnis I1 | | | Gesamt |
|-------------------|------|---------------------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | CR | PR | Rez. | |
| Fieber_vor_I1 | nein | Anzahl | 23 | 18 | 12 | 53 |
| | | % von Fieber vor I1 | 43,4% | 34,0% | 22,6% | 100,0% |
| | ja | Anzahl | 9 | 5 | 4 | 18 |
| | | % von Fieber vor I1 | 50,0% | 27,8% | 22,2% | 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtzahl | 32 | 23 | 16 | 71 |
| | | % von Fieber vor I1 | 45,1% | 32,4% | 22,5% | 100,0% |

Anlage 6.3 Beziehung zwischen der Leukopeniedauer I1 und dem Therapieergebnis I1

| | | | Therapieergebnis I1 | | | Gesamt |
|---------------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|-------|--------|
| | | | CR | PR | Rez. | |
| Leukopenie-dauer_I1 | <20d | Anzahl | 16 | 3 | 9 | 28 |
| | | % von Leukopeniedauer_I1 | 57,2% | 10,7% | 32,1% | 100,0% |
| | >=20d | Anzahl | 16 | 20 | 7 | 43 |
| | | % von Leukopenietage_I1 | 37,2% | 46,5% | 16,3% | 100,0% |
| | | Standardisierte Residuen | 2,0 | -2,0 | 1,1 | |
| | | Standardisierte Residuen | -1,8 | 1,6 | -,9 | |
| Signifikanz p=0,01 | | Gesamtanzahl | 32 | 23 | 16 | 71 |
| | | % von Leukopeniedauer_I1 | 45,1% | 32,4% | 22,5% | 100,0% |

Anlage 6.4 Beziehung zwischen der Leukopeniedauer I2 und dem Therapieergebnis I2

| | | | Therapieergebnis I2 | | | Gesamt |
|---------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| | | | CR | PR | Rez. | |
| Leukopenie-dauer_I2 | <20d | Anzahl % von Leukopeniedauer_I2 | 5 41,7% | 4 33,3% | 3 25,0% | 12 100,0% |
| | >=20d | Anzahl % von Leukopenietage_I2 | 7 43,7% | 8 50,0% | 1 6,3% | 16 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtanzahl % von Leukopeniedauer_I2 | 12 42,9% | 12 42,9% | 4 14,2% | 28 100,0% |

Anlage 6.5 Beziehung zwischen der Leukopeniedauer K1 und dem Therapieergebnis K1

| | | | Therapieergebnis K1 | | | Gesamt |
|---------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| | | | CR | PR | Rez. | |
| Leukopenie-dauer_K1 | <20d | Anzahl % von Leukopeniedauer K1 | 14 63,6% | 6 27,3% | 2 9,1% | 22 100,0% |
| | >=20d | Anzahl % von Leukopenietage K1 | 13 59,1% | 6 27,3% | 3 13,6% | 22 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtanzahl % von Leukopeniedauer K1 | 27 61,3% | 12 27,3% | 5 11,4% | 44 100,0% |

Anlage 6.6 Beziehung zwischen der Leukopeniedauer K2 und dem Therapieergebnis K1

| | | | Therapieergebnis K2 | | | Gesamt |
|---------------------|-------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| | | | CR | PR | Rez. | |
| Leukopenie-dauer_K2 | <20d | Anzahl % von Leukopeniedauer K2 | 9 52,9% | 5 29,5% | 3 17,6% | 17 100,0% |
| | >=20d | Anzahl % von Leukopenietage K2 | 8 66,7% | 1 8,3% | 3 25,0% | 12 100,0% |
| nicht signifikant | | Gesamtanzahl % von Leukopeniedauer K2 | 17 58,6% | 6 20,7% | 6 20,7% | 21 100,0% |